

[Grucho? krokowy - biopsja](#) [1]

Poradnik dla pacjentów b?d?cych po biopsji grucho?u krokowego

Po biopsji grucho?u krokowego pacjent **przez trzy tygodnie powinien stosowa? si? do poni?szych zalece?**:

- nie spo?ywa? alkoholu
- nie wykonywa? ci??kich prac fizycznych
- nie bra? gor?cych k?pieli (nale?y korzysta? z prysznic)
- nie przyjmowa? aspiryny, ?rodków zawieraj?cych aspiryn? i leków przeciwpalnych.

Nale?y przyjmowa? leki przepisane przez lekarza wed?ug zalece? w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

Przez kilka dni okresowo mo?e pojawi? si? krew w stolcu i moczu.

Powszechne jest równie? pojawienie si? krwi w kilku pierwszych wytryskach po biopsji.

Je?eli krwawienie z dróg moczowych lub odbytnicy jest nieprzerwane lub pojawi?a si? gor?czka przekraczaj?ca 38 stopni C, nale?y skontaktowa? si? z Poradni? Urologiczn? (tel. 41 36-74-779) lub lekarzem w swojej poradni rejonowej.

Wizyta kontrolna w Poradni Urologicznej wyznaczona jest w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

Pacjent powinien równie? stosowa? si? do zalece? z karty informacyjnej leczenia szpitalnego.

Source URL: <https://onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/gruczol-krokowy-biopsja?mini=2021-09>

Links

[1] <https://onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/gruczol-krokowy-biopsja>