


# Rak pęcherza moczowego (ICD10: C67)

Opracowanie: Centrum Badań Naukowych, Epidemiologii i Prac Badawczo-Rozwojowych  
(wg stanu na dzień 15.04.2024 r.)


W województwie świętokrzyskim w 2021 roku odnotowano 285 zachorowań na raka pęcherza moczowego (228 mężczyzn i 57 kobiet). Najczęściej występującym typem histologicznym był rak urotelialny (53.7%), a następnie rak urotelialny brodawkowaty (41.8%). W strukturze zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem rak pęcherza moczowego stanowił 4.5% i był czwartą przyczyną zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn i czternastą u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik zachorowalności dla mężczyzn wynosił 17.6/100 000 i 3.4/100 000 dla kobiet. Na przestrzeni ostatnich 23 lat trend czasowy zachorowalności dla mężczyzn wskazywał zróżnicowaną tendencję zmian. W latach 2000-2006 obserwowana była tendencja spadkowa z następującym wzrostem zachorowalności w latach 2006-2008 i spadkiem w latach 2008-2014. Po roku 2014 zachorowalność na raka pęcherza moczowego u mężczyzn zaczęła wzrastać aż do roku 2017. Trend zachorowalności dla kobiet miał stabilny przebieg. W analizowanym okresie wartość standaryzowanego według wieku współczynnika zachorowalności dla mężczyzn uległa obniżeniu o 18.7%, dla kobiet o 1.5%.

W 2021 roku odnotowano 155 zgonów z powodu raka pęcherza moczowego (122 mężczyzn i 33 kobiety). W strukturze zgonów na nowotwory złośliwe ogółem rak pęcherza moczowego stanowił 4.8% i był czwartą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i jedenastą u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik umieralności dla mężczyzn wynosił 8.7/100 000 i 1.5/100 000 dla kobiet. Na przestrzeni ostatnich 23 lat trend czasowy umieralności dla mężczyzn kształtował się na stabilnym poziomie z okresowymi wzrostami umieralności w latach 2000, 2008 oraz 2015-2016. Trend umieralności dla kobiet miał stabilny przebieg. W analizowanym okresie wartość standaryzowanego według wieku współczynnika umieralności dla mężczyzn wzrosła o 9.4%, natomiast dla kobiet wzrosła o 34.2%.


Zachorowania na raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, 2021 rok




Zgony z powodu raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, 2021 rok




Histopatologia raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, 2021 rok



Zachorowania na raka pęcherza moczowego według płci i powiatów województwa świętokrzyskiego, 2021 rok




Zachorowania i zgony z powodu raka pęcherza moczowego według powiatów województwa świętokrzyskiego, 2021 rok




## Zachorowalność i umieralność na raka pęcherza moczowego w 2021 roku według województw

	Zachorowalność								Umieralność							
	Mężczyźni				Kobiety				Mężczyźni				Kobiety			
	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.
Dolnośląskie	468	15.96	33.56	5.19	166	4.36	11.02	1.12	226	7.30	16.21	3.45	72	1.49	4.78	0.58
Kujawsko-Pomorskie	348	17.76	35.53	5.74	116	4.50	11.11	1.19	182	8.73	18.58	4.10	30	0.94	2.87	0.37
Lubelskie	369	17.94	37.21	5.87	97	3.50	9.18	0.96	140	6.38	14.12	2.82	31	0.72	2.93	0.38
Lubuskie	110	11.49	22.88	3.49	47	3.99	9.24	0.90	65	6.37	13.52	2.89	27	1.95	5.31	0.70
łódzkie	304	12.13	26.53	3.89	114	3.76	9.05	0.86	205	7.77	17.89	3.55	54	1.29	4.29	0.49
Małopolskie	380	11.84	22.83	3.87	103	2.66	5.83	0.64	303	8.54	18.20	4.09	78	1.44	4.42	0.62
Mazowieckie	545	10.75	20.65	3.32	170	2.36	5.92	0.67	399	7.09	15.12	3.15	106	1.19	3.69	0.47
Opolskie	165	16.81	35.82	5.05	30	2.43	6.10	0.64	83	7.78	18.02	3.35	19	1.13	3.86	0.50
Podkarpackie	200	9.93	19.54	3.20	64	2.55	6.00	0.63	121	5.40	11.82	2.84	31	1.11	2.90	0.34
Podlaskie	165	14.91	29.41	4.34	54	3.63	9.12	0.96	88	7.47	15.68	2.98	27	1.60	4.56	0.51
Pomorskie	510	22.79	44.49	8.09	178	6.13	14.69	1.81	171	7.33	14.92	3.26	57	1.58	4.71	0.66
Śląskie	670	14.85	31.68	4.48	240	3.80	10.54	1.10	372	7.67	17.59	3.08	122	1.62	5.36	0.67
<b>Świętokrzyskie</b>	<b>228</b>	<b>17.57</b>	<b>39.25</b>	<b>5.45</b>	<b>57</b>	<b>3.38</b>	<b>9.31</b>	<b>0.89</b>	<b>122</b>	<b>8.65</b>	<b>21.00</b>	<b>4.15</b>	<b>33</b>	<b>1.53</b>	<b>5.39</b>	<b>0.63</b>
Warmińsko-Mazurskie	172	13.17	25.51	4.35	66	4.12	9.35	0.92	89	6.66	13.20	2.99	43	2.23	6.09	0.79
Wielkopolskie	455	14.06	26.73	4.56	139	3.08	7.72	0.89	295	8.65	17.33	3.89	106	2.14	5.89	0.79
Zachodniopomorskie	212	12.77	26.37	3.51	101	5.00	11.87	1.24	117	6.46	14.55	2.87	53	1.95	6.23	0.78
<b>Polska</b>	<b>5301</b>	<b>14.30</b>	<b>28.87</b>	<b>4.54</b>	<b>1742</b>	<b>3.58</b>	<b>8.88</b>	<b>0.95</b>	<b>2978</b>	<b>7.48</b>	<b>16.22</b>	<b>3.37</b>	<b>889</b>	<b>1.47</b>	<b>4.53</b>	<b>0.57</b>


### Zachorowalność na raka pęcherza moczowego według województw, 2021 rok, ASW\*




### Umieralność z powodu raka pęcherza moczowego według województw, 2021 rok, ASW\*




### Zachorowalność na raka pęcherza moczowego według płci i województw, 2021 rok, ASW\*




### Zachorowalność i umieralność z powodu raka pęcherza moczowego według województw, 2021 rok, ASW\*



### Trendy zachorowalności na raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, ASW\*



### Trendy umieralności z powodu raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, ASW\*



\* ASW (Age-standardized World) – Standaryzowany (wg wieku) współczynnik zachorowalności/umieralności

\*\* CR (Crude rate) – Surowy współczynnik zachorowalności/umieralności