

Rak pęcherza moczowego (ICD10: C67)


Opracowanie: Centrum Badań Naukowych, Epidemiologii i Prac Badawczo-Rozwojowych
(wg stanu na dzień 30.06.2025 r.)




W województwie świętokrzyskim w 2022 roku odnotowano 253 zachorowania na raka pęcherza moczowego (196 mężczyzn i 57 kobiet). Najczęściej występującym typem histologicznym był rak urotelialny (64.2%), a następnie rak urotelialny brodawkowaty (29.5%). W strukturze zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem rak pęcherza moczowego stanowił 3.8% i był czwartą przyczyną zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn i czternastą u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik zachorowalności dla mężczyzn wynosił 14.3/100 000 i 3.4/100 000 dla kobiet. Na przestrzeni ostatnich 24 lat trend czasowy zachorowalności dla mężczyzn wskazywał zróżnicowaną tendencję zmian. W latach 2000-2006 obserwowana była tendencja spadkowa z następującym wzrostem zachorowalności w latach 2007-2008 i spadkiem w latach 2009-2014. Po roku 2014 zachorowalność na raka pęcherza moczowego u mężczyzn zaczęła wzrastać aż do roku 2017, po którym obserwowany jest spadek zachorowań. W analizowanym okresie wartość standaryzowanego według wieku współczynnika zachorowalności dla mężczyzn uległa obniżeniu o 34.0%. Trend zachorowalności dla kobiet miał stabilny przebieg.

W 2022 roku odnotowano 140 zgonów z powodu raka pęcherza moczowego (115 mężczyzn i 25 kobiet). W strukturze zgonów na nowotwory złośliwe ogółem rak pęcherza moczowego stanowił 4.2% i był czwartą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i piętnastą u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik umieralności dla mężczyzn wynosił 7.7/100 000 i 1.2/100 000 dla kobiet. Na przestrzeni ostatnich 24 lat trend czasowy umieralności dla mężczyzn kształtował się na stabilnym poziomie z okresowymi wzrostami umieralności w latach 2000, 2008 oraz 2015-2016. W analizowanym okresie wartość standaryzowanego według wieku współczynnika umieralności dla mężczyzn obniżyła się o 2.7%. Trend umieralności dla kobiet miał stabilny przebieg.


Zachorowania na raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, 2022 rok




Zgony z powodu raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, 2022 rok




Histopatologia raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, 2022 rok



Zachorowania na raka pęcherza moczowego według płci i powiatów województwa świętokrzyskiego, 2022 rok




Zachorowania i zgony z powodu raka pęcherza moczowego według powiatów województwa świętokrzyskiego, 2022 rok




Zachorowalność i umieralność na raka pęcherza moczowego w 2022 roku według województw

	Zachorowalność								Umieralność							
	Mężczyźni				Kobiety				Mężczyźni				Kobiety			
	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.
Dolnośląskie	519	17.74	37.33	5.42	179	4.46	11.92	1.26	256	8.25	18.41	3.94	85	1.82	5.66	0.68
Kujawsko-Pomorskie	294	14.81	30.20	4.55	131	5.05	12.62	1.25	190	9.08	19.52	3.58	65	2.21	6.26	0.73
Lubelskie	341	16.32	34.68	5.27	97	3.34	9.26	0.94	150	6.62	15.26	2.91	36	0.98	3.44	0.40
Lubuskie	175	17.93	36.67	5.62	59	5.51	11.67	1.15	77	7.66	16.14	3.19	27	1.68	5.34	0.71
Łódzkie	257	10.37	22.61	3.16	93	2.70	7.45	0.73	200	7.41	17.60	3.25	76	1.77	6.09	0.68
Małopolskie	347	10.57	20.86	3.45	99	2.59	5.61	0.63	271	7.59	16.29	3.52	66	1.14	3.74	0.53
Mazowieckie	399	7.60	15.12	2.58	163	2.08	5.67	0.66	374	6.68	14.17	2.84	150	1.66	5.22	0.68
Opolskie	134	13.18	29.33	4.28	38	2.87	7.78	0.77	82	7.70	17.95	3.14	17	1.00	3.48	0.41
Podkarpackie	262	13.00	25.72	4.17	77	2.85	7.24	0.83	113	4.95	11.09	2.42	29	0.85	2.73	0.37
Podlaskie	150	13.06	26.91	4.05	51	3.30	8.67	0.91	75	5.82	13.45	2.80	34	1.70	5.78	0.72
Pomorskie	467	20.88	40.75	7.09	134	4.52	11.05	1.32	175	7.12	15.27	3.52	55	1.38	4.54	0.68
Śląskie	644	14.19	30.70	4.32	229	3.64	10.12	1.01	353	7.24	16.83	3.03	124	1.83	5.48	0.61
Świętokrzyskie	196	14.27	34.07	5.11	57	3.43	9.39	0.88	115	7.70	19.99	4.11	25	1.17	4.12	0.46
Warmińsko-Mazurskie	220	16.66	32.89	5.01	70	4.16	9.99	0.97	110	8.00	16.44	3.75	33	1.45	4.71	0.66
Wielkopolskie	390	11.80	22.96	3.89	110	2.65	6.12	0.69	313	9.19	18.42	3.75	74	1.44	4.12	0.57
Zachodniopomorskie	359	20.52	44.96	6.75	136	6.12	16.07	1.52	131	7.13	16.40	3.02	46	1.66	5.43	0.65
Polska	5154	13.70	28.19	4.37	1723	3.46	8.81	0.93	2985	7.39	16.33	3.26	942	1.53	4.82	0.61


Zachorowalność na raka pęcherza moczowego według województw, 2022 rok, ASW*




Umieralność z powodu raka pęcherza moczowego według województw, 2022 rok, ASW*




Zachorowalność na raka pęcherza moczowego według płci i województw, 2022 rok, ASW*




Zachorowalność i umieralność z powodu raka pęcherza moczowego według województw, 2022 rok, ASW*



Trendy zachorowalności na raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, ASW*



Trendy umieralności z powodu raka pęcherza moczowego, województwo świętokrzyskie, ASW*



* ASW (Age-standardized World) – Standaryzowany (wg wieku) współczynnik zachorowalności/umieralności
 ** CR (Crude rate) – Surowy współczynnik zachorowalności/umieralności