

W Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prowadzone są obecnie 3 badania kliniczne w rozpoznaniu: rak jajnika oraz rak endometrium.

2018-001973-25 (EudraCT Number)
(MK-7339-001/KEYLYNK-001/ENGOT-ov43/GOG-3036)

Tytuł angielski: „Study of Chemotherapy With Pembrolizumab (MK-3475) Followed by Maintenance With Olaparib (MK-7339) for the First-Line Treatment of Women With BRCA Non-mutated Advanced Epithelial Ovarian Cancer (EOC)”

Tytuł polski: „Badanie kliniczne 2 fazy z randomizacją, podwójnie zaślepienie prowadzone chemioterapią z pembrolizumabem lub bez i następowym leczeniem podtrzymującym z Olaparibem lub placebo jako leczenie pierwszego rzutu w zaawansowanym nabłonkowym raku jajnika. (EOC) bez mutacji BRCA”

Obecnie w powyższym badaniu rekrutacja nowych pacjentów jest już zakończona.

2020-003424-17 (EudraCT Number)
(KEYNOTE-B21 / ENGOT-en11 / GOG-3053)

Tytuł angielski: „A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Pembrolizumab Versus Placebo in Combination With Adjuvant Chemotherapy With or Without Radiotherapy for the Treatment of Newly Diagnosed High-Risk Endometrial Cancer After Surgery With Curative Intent”

Tytuł polski: „Randomizowane, podwójnie zaślepienie badanie kliniczne 3 fazy oceniające stosowanie pembrolizumabu w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią adjuwantową z lub bez radioterapii w leczeniu nowo rozpoznanego raka endometrium wysokiego ryzyka po operacji ukierunkowanej na wyleczenie.”

Jest to wieloośrodkowe, randomizowane badanie 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, realizowane w grupach równoległych, oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią adjuwantową i radioterapią lub bez radioterapii u uczestniczek z rakiem endometrium, które nie otrzymały wcześniej żadnej linii leczenia. Badanie jest skierowane do pacjentek z nowo rozpoznany rakiem endometrium wysokiego ryzyka, w tym również z mięsakorakiem, które nie przyjmowały leczenia chemioterapeutycznego ani nie otrzymały radioterapii z powodu raka endometrium.

2020-005027-37 (EudraCT Number)
(KEYNOTE-B96/ENGOT-ov65)

Tytuł angielski: „A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Pembrolizumab Versus Placebo in Combination With Paclitaxel With or Without

Bevacizumab for the Treatment of Platinum-resistant Recurrent Ovarian Cancer”

Tytuł polski: „Randomizowane badanie fazy 3 z podwójnie ślełą próbą, oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z paklitakselem oraz bevacizumabem lub bez bevacizumabu w leczeniu platynoopornego nawrotowego raka jajnika.”

Jest to wieloośrodkowe, randomizowane badanie 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, realizowane w grupach równoległych, oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z paklitakselem i bevacizumabem lub bez bevacizumabu u uczestniczek z platynoopornym nawracającym rakiem jajnika, które otrzymały wcześniej nie więcej niż 2 linie leczenia.

Uczestniczki musiały otrzymać co najmniej 1 linię chemioterapii opartej na pochodnych platyny z powodu raka jajnika i mieć oznaki radiologiczne progresji choroby w okresie 6 miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki (tj. z chorobę oporną na związki platyny).

Dozwolone jest wcześniejsze stosowanie antagonistów PD-1 lub PD-L1, wcześniejsze stosowanie inhibitora PARP i wcześniejsze stosowanie bevacizumabu.