

INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED BADANIEM REZONASU MAGNETYCZNEGO

Na czym polega?

- zwykle trwa od 15 do 90 minut,
- jest bezbolesne z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego,
- w trakcie badań nie można się poruszać, a niektóre z nich wymagają wstrzymywania oddechu,
- można zabrać stopery / zatyczki do uszu z powodu wysokiego hałasu
- w celu zmniejszenia objawów klaustrofobii wewnątrz tunelu zainstalowane jest dodatkowe oświetlenie a pacjent otrzymuje przycisk alarmowy, ponadto głośnik i mikrofon umożliwiają komunikację głosową,
- w niektórych badaniach MR konieczne jest dożylnie podanie środka kontrastowego, które mogą wywołać działania niepożądane (np.: nudności, wymioty, zawroty głowy, uczucie osłabienia, omdlenie, wysypka, wstrząs anafilaktyczny). Większość działań niepożądanych ma przebieg łagodny i krótkotrwały i ustępuje samoistnie. W przypadku pojawienia się działań wymagających interwencji lekarza otrzyma Pan/i pomoc i zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Jak przygotować się do badania MR?

- pacjenci do badania MR zobowiązani są zgłosić się na wyznaczoną godziną,
- pozostać **na czczo 3 godziny** przed planowanym badaniem,
- zabrać ważny **wynik kreatyniny** (*badanie z krwi ważne 1 miesiąc*),
- zabrać dokument tożsamości oraz **oryginal lub e-skierowanie na badanie**,
- zabrać wyniki wcześniejszych badań (np. USG, TK, MR, karty wypisowe ze szpitali itd.),
- **zabrać dokumentację medyczną dotyczącą leczenia operacyjnego** zawierającą informację na temat zastosowanego **implantu lub rodzaju materiału ciała obcego w ciele (np.: stentów, by-passów, endoprotez) i/lub zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonania badania MR w polu 1.5T lub 3.0T!**
- nie zaleca się wykonywania badań w 1 trymestrze ciąży,
- leki stosowane przewlekłe należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza,
- przed wejściem do Pracowni MR należy bezwzględnie pozbyć się metalowych przedmiotów takich jak: okulary, klucze, zegarek, telefon, biżuterię, protezy zębowe itp.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może narazić na niebezpieczeństwo personel medyczny i / lub pacjenta oraz spowodować uszkodzenie aparatu.

- **UWAGA!** Pacjenci posiadający wszczepione urządzenia elektryczne (stymulator/rozrusznik serca, implanty ślimakowe) **NIE MOGĄ** mieć wykonanego badania MR!

Badanie MR piersi	Badanie MR gruczołu krokowego (prostaty)
1. zalecane między 5 a 14 dniem cyklu, 2. nie należy używać antyperspirantów, 3. terapię hormonalną należy odstawić na 2 miesiące przed badaniem	1. należy być wypróżnionym, 2. jeżeli była wykonywana biopsja należy zabrać wynik (kserokopia),

Wynik badania (opis) otrzymuje pacjent lub osoba upoważniona w formie pisemnej wraz z płytą CD. W przypadku pacjentów kierowanych na badanie z Poradni / Działów ŚCO wynik przekazywany jest do lekarza kierującego.

Ustalony termin badania	Godzina	Pokój
.....