

ŚWIADOMA ZGODA NA WYKONANIE BADANIA UROGRAFII
ORAZ DOŻYLNIE PODANIE ŚRODKA KONTRASTOWEGO – ŚCO

W przypadku badania urografii wymagane jest dożylne podanie środka kontrastowego celem dokładniejszego uwidocznienia nerek i rozpoznaniu, czy nie jest zaburzona czynność wydzielania moczu. Niekiedy jednak środki kontrastowe mogą wywoływać działania niepożądane. Większość działań niepożądanych ma przebieg łagodny i krótkotrwały i ustępuje samoistnie.

Możliwe działania niepożądane po podaniu jodowych środków kontrastowych:

- Dość częste (ok. 1 na 20 pacjentów) – uczucie gorąca, bóle głowy, nudności.
- Rzadkie (ok. 1 na 100-1000 pacjentów) – suchość w ustach, zmiany ciśnienia krwi, wymioty, biegunka, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, uczucie osłabienia, dreszcze, podwyższona temperatura, swędzenie skóry, wysypka, pokrzywka, omdlenie, zgaga, ból w jamie brzusznej, ból mięśni, obrzęk twarzy, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli, ból w klatce.
- Bardzo rzadkie (rzadziej niż 1 na 10.000 pacjentów) – wśród, których najcięższe to: drgawki, zapalenie trzustki, obrzęk płuc, zatrzymanie oddechu, zatrzymanie krążenia, wzrost ciśnienia śródczaszkowego, wstrząs anafilaktyczny, zgon (ok. 1 na 1.000.000 pacjentów).

Czy jest Pani w ciąży lub podejrzewa Pani ciążę? TAK / NIE
(zaznaczyć właściwą odpowiedź w kółko)

Badanie urografii wykonywane jest wyłącznie po dożylnym podaniu środka kontrastowego, nie wykonuje się w/w badania bez środka kontrastowego ponieważ traci się celowość wykonania takiego badania.

U pacjentek w ciąży alternatywnym badaniem może urografia rezonansem magnetycznym lub USG jamy brzusznej. W innych przypadkach alternatywną metodą badania jest urografia tomografem komputerowym, która jest najlepszym badaniem do wykrycia kamieni nerkowych, guzów nerek i guzów pochodzących z nabłonka przejściowego w górnych drogach moczowych, jednak o większej dawce obciążającej dla pacjenta niż w tym badaniu. Dlatego badanie tomografii komputerowej powinno się wykonywać u Pacjentów wysokiego ryzyka oraz u pacjentów niskiego ryzyka z nieprawidłowymi wynikami wyjściowymi USG, RTG, Cystoskopia. U reszty pacjentów badanie Urografii RTG jest zalecane jako pierwsze badanie lub do monitorowania przebiegu choroby.

Badanie, które proponujemy wymaga Państwa świadomej, dobrowolnej pisemnej zgody. Jest to zabieg diagnostyczny. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury będzie brak możliwości postawienia diagnozy, oceny zaawansowania klinicznego choroby, prognozowania przebiegu choroby, oceny progresji i regresji choroby. Odmowna decyzja Państwa może skutkować niepodjęciem właściwego leczenia, zagrożeniem życia włącznie ze zgonem.

Ja niżej podpisany/a potwierdzam, że zapoznałem/am się z w/w informacjami i są one dla mnie zrozumiałe i wyjaśniono mi wszelkie wątpliwości. Jednocześnie oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

<p>Wyrażam zgodę na badanie oraz podanie środka kontrastowego</p> <p>.....</p> <p>Data i podpis pacjenta lub opiekuna</p>	<p>Nie wyrażam zgody na badanie oraz podanie środka kontrastowego</p> <p>.....</p> <p>Data i podpis pacjenta lub opiekuna</p>
--	--

**W przypadku braku zgody pacjenta, pacjent tym samym rezygnuje z wykonania badania
oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za konsekwencje braku diagnozy.**

<p>Pacjent nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji z powodu:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data, pieczętka i podpis lekarza kierującego na badanie</p>	<p>Potwierdzam, że pacjent został poinformowany o sposobie badania i powikłaniach mogących powstać w wyniku przeprowadzonych procedur</p> <p>.....</p> <p>Data, pieczętka i podpis lekarza kierującego na badanie</p>
---	---